## 验 周 JE 潮广 完

1992年(平成4年)11月11日(水曜日)

## 閉塞性動脈硬化症の最新



90%の狭窄を起こアテローム切除後 =札医大第2内科

ります。間欠性段(は)行と ・アテローム 1716 ってください。 (3) 4

きた日本でも増え続けていま循環を助けている時は特に症 血管内にカッター挿で

りつき、さらに内膜が厚くな レステロールや血の塊がとび している状態は、十代の人で 欧米ではもともと多い两気で も増えています。 すが、食事が欧米型になって 動不足、肥満、ストレスなど、 原因は栄養過多の食事と運

どんな病気でしょうか 簡単にいうと、動脈壁にコ

- 閉塞性動脈硬化症とは

目立つ若年化

かとさえ言われています。 どに気を使っていますから、 いずれは逆転するのではない ごく初期や、 側副路といっ ■下肢にしびれ 今は欧米人の方が食事な -特徴的な症状は? いって、一定の距離を歩くと ります

けでなく、神経も侵すことが 病の合併症として出てきた動 脈閉塞症の場合です。動脈だ 気をつけて欲しいのは糖尿

て細い血管が発達して血液の ない状態になります。しびれ 脚が痛み、休まなければいけ や痛みは、血管が収縮する寒 い時期や運動時に特に強くな

します。 そしで、つまっている物を

やけどやけがにも気付きにく いので、手足には常に気を配 ームを切り取ることから「ア ゅ)といいます。このアテロ アテローム、路櫃(じゅくし レステロールと血の現などを ます。狭窄を起こしているコ テローム切除術」など呼ば 用で意味か?

脚のしびれや冷感、痛みがあ

す。主に下肢の動脈の病気で、

いる部分が比較的まっすぐな 内側に向かって突出している ー病という、 末梢 (まっしょ 限られます。また、バージャ こと、アテロームを超こして るのは、アテロー人が血管の う)の細い血管の病気には不 以内で短いことなどの場合に 血管にあること、長さが五代 残念ながらこの方法が使え

■約4割が再発 治療法は?

さらに一歩進んで、先端にカッターを取り付けたカデーデルで、アテロームという血管内

に詰まった物を切除する方法が少しずつ広まりつつある。バルーンに比べて再発が少ない

寸。

との治療法について、札幌医大第二内科の風本和明助教授に聞いた。

中年以降の男性に多いが、若年化が目立つ動脈硬化だ。治療法は血管の再建手術に代わり、 な原因で起きている中で、最近増えているものの一つに閉塞(そく)性動脈硬化症がある。

寒くなると、手足の痛み、しびれを訴える人が増えてくる。痛みやしびれば、さまざま

カテーテルを血管に挿入してバルーン(風鉛)で血管をふくらませる方法が普及してきた。

い人では三週間くらいで再発 すが、血管を押し広げるだけ 患者さんの負担が少ないので た。血質の外科手術に比べて を入れ、バルーンをふくらま 窄(さく)を起こします。早 に行われるようになりまし せて血管を広げる方法が普通 なので四割くらいの人が再狭 段近は血管内にカテーテル にそって何度も同じ場所に挿 イヤを通しておくので、それ す。礼医大では一年ほど前か ることができます。一局部除政 ガイドワイヤという金属のワ く時に取り出せます。最初に 発が少ないのが特徴。また、 で、二、三百の入院で可能で 取り出した組織の内容を調べ 入できます。 付けて聞き、カテーテルを抜 ら始めた方法ですが、また旨 削り取った物は先端に押し 狭窄部分を削り取るので再

局部麻酔で入院は2、3日 でも血行を備えなくなると、 状がありません。との側割路 配血による症状が出てきま あるので、療力に鈍感になり、 あります。それだけでなく、 虚血状態に気付かないことが 切り取る方法も試みられてい

発した例はありません。

ーすべての動脈硬化に適

**阿気ですが、最近は若年化が** 

あり、中年以降の男性に多い す。いろいろな段階と程度が って動脈が硬くなる病気で

目立ちます。初期の脂肪斑(は

むいます。 やはりカテーテルを使うの ーとんな方法ですか

ですが、先端に中が空洞の器 的進させ、アテロームを削り をふくらませてびったり押し を病変部に合わせ、バルーン セットされています。開口部 異が付いていて、 カッターが 付けます。そしてカッターを 向きです。 もなく適用範囲は広がると思 良が研究されているので、間 にも応用しようと、器具の改 ただ、最近は心臓の短動脈

取ります(図参照)。